



Programfüzet

2013. november 22-23., Thermal Hotel Visegrád

UPDATE 2013

A SEMMELWEIS EGYETEM
II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

**SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAMA**

VAJON MELYIKÜK?



MAGYARORSZÁGON A NŐK AKÁR
56%-A NEM KÉPES A FOLSAVAT
MEGFELELŐEN HASZNOSÍTANI.*

CSAK A *femibion*[®]
MAGZATVÉDŐ VITAMINOK TARTALMAZNAK
METAFOLIN[®]-T

* Czeizel E. et al (2001): A metiléntetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) gén polimorfizmusának (C677T) magyarországi gyakorisága. Orvosi Hetilap 2001, 142 (23), 1227-1229 alapján

MCFE315/13113



Kedves Kolléganők és Kollégák!

A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez, minden év november végén, Update címmel. Az első rendezvényt 2013. november 22-23-án tartjuk a visegrádi Thermal Hotelben.

Az előadások megtartására a klinika munkatársai mellett az adott témakör vezető hazai szaktekintélyeit kértük fel. Nagy örömünkre szolgál, hogy számos kiváló barátunkat köszönhetjük előadóként rendezvényünkön, akik a felkérést első szóra, készséggel fogadták el. A továbbképző tanfolyam során kifejezetten a gyakorló nőgyógyász mindennapi munkája során felmerülő kérdésekre koncentrálnunk, az elmúlt év legfrissebb információit összefoglalva.

A Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (50 kreditpont). A téli ünnepek előtti találkozással a szakmai továbbképzésen túl jó lehetőség adódik a szülészeti-nőgyógyászati aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő kikapcsolódásra is. Azt reméljük, hogy a gyönyörű környezet tökéletes helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez, a magunk részéről mindent megteszünk a kiemelkedő szakmai program biztosítása érdekében.

Dr. Ács Nándor
egyetemi docens, igazgató

Prof. Dr. Bánhidly Ferenc
egyetemi tanár, igazgató-helyettes



UPDATE 2013 - Szervező Intézmény



Tudományos Szervezők

Dr. Ács Nándor, igazgató

SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Prof. Dr. Bánhidó Ferenc, igazgató-helyettes

SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest



TEVA

Nőgyógyászat

Minőségi fogamzásgátlók elérhető áron.

CORENELLE

drosipirenon/etinilösztadiol

kedvező testsúlyra gyakorolt hatás¹⁾

4. generációs gesztagen komponens

Corenelle 3 mg/0,02 mg filmtableta, Corenelle 3 mg/0,03 mg filmtableta
Minőségi és mennyiségi összetétel: 3 mg drosipirenon és 0,02 mg etinilösztadiol, illetve 3 mg drosipirenon és 0,03 mg etinilösztadiol filmtablettákban.

Terápiás javallatok: Orális fogamzásgátlás.

Adagolás és alkalmazás: A tablettákat a buboréksomagoláson feltüntetett sorrendben, minden nap körülbelül ugyanabban az időpontban kell bevenni. 21 egymást követő napon keresztül, naponta 1 tablettát kell bevenni. A következő csomag szedését egy 7 napos tablettamentes időszak után kell elkezdni, melynek során általában megvonásos vérzés lép fel. A megvonásos vérzés általában az utolsó tableta bevételét követő 2-3. napon jelentkezik, és nem feltétlenül fejeződik be a következő csomag szedésének kezdetéig. A készítmény elkezdésével, más fogamzásgátlóról történő átállással és esetleges kihagyással kapcsolatban további információ az alkalmazási előírásban található.

Ellenjavallatok: Az alábbiakban felsorolt betegségekben és állapotokban nem szabad kombinált orális fogamzásgátlókat (COC) szedni. Amennyiben a COC alkalmazásának ideje alatt jelentkezik valamelyik a felsorolt betegségek közül, azonnal abba kell hagyni a készítmény szedését.

Fennálló vagy a körülményben szereplő vénás thrombosis (mélyvénás thrombosis, tüdőembólia), fennálló vagy a körülményben szereplő artériás thrombosis (pl. myocardialis infarktus) vagy ennek kialakulására utaló állapotok (pl. angina pectoris, átmeneti ischaemiás roham); fennálló vagy a körülményben szereplő cerebrovasculáris esemény; artériás thrombosis súlyos vagy többszörös rizikofaktorainak jelenléte; diabetes mellitus vasculáris tünetekkel; súlyos hipertónia; súlyos dyslipoproteinaemia; örökített vagy szerzett hajlam vénás vagy artériás thrombosisra, például APC-rezisztencia, antithrombin-III hiány, protein-C hiány, protein-S hiány, hyperhomocystaemia és antifoszfolipid-antitestek (antikardiolipin-antitestek, lupus

anticoaguláns); fennálló vagy a körülményben szereplő pancreatitis, ha súlyos hypertrigliceridaemiával társul; fennálló vagy a körülményben szereplő súlyos májbetegség, amíg a májfunkció-értékek nem normalizálódnak; súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség; fennálló vagy a körülményben szereplő (jó- vagy rosszindulatú) májdaganat; ismert vagy feltételezett, szexuálissteroid-dependens rosszindulatú daganatok (pl. nemi szervek vagy emlő rosszindulatú daganatai); tisztázatlan eredetű hüvelyi vérzés; fokális neurológiai tünetekkel járó migrén a körülményben; a Corenelle filmtablettá hatoanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Gyakran az alábbi mellékhatások fordulnak elő; érzelmi labilitás, fejfájás, depresszív hangulat, migrén, hasi fájdalom, hányinger, acne, emlőfájdalom, emlő megnagyobbodása, emlőérzékenység, dysmenorrhoea, metrorrhagia, leukorrhoea, hüvelyi monília, testsúlygyarapodás. Nem gyakran és ritkán további mellékhatások is felélelhetnek.

Megjegyzés: * (egy keresztet)
Ösztályozás: II. csoportú Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Teva Magyarország Zrt. 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

A forgalomba hozatali engedély száma:

Corenelle 3 mg/0,02 mg filmtableta: OGYI-T-21495/01 (1x21 db) és OGYI-T-21495/02 (3x21 db)

Corenelle 3 mg/0,03 mg filmtableta: OGYI-T-21495/03 (1x21 db) és OGYI-T-21495/04 (3x21 db)

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2012. december 20.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Forrás: 1. Foidart JM et al. Contraception 2006; 73: 34-40.

Teva Magyarország Zrt.

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5. | Levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház

Telefon: (1) 288 6400 | Fax: (1) 288-6410 | További információk: www.teva.hu

HU/COREN13/00006

ARANY fokozatú támogatók



Bayer HealthCare



EZÜST fokozatú támogatók



LADEEPHARMA



RICHTER GEDEON



VitaminKosár Kft.



Kiállítók



Tudományos program

NOVEMBER 22., PÉNTEK

9:30-9:45 Megnyitó

Dr. Ács Nándor, igazgató

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

9:45-11:15 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

Terhesség alatti magas vérnyomás gyógyszeres kezelése

Prof. Dr. Rigó János

Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A terhességi hypertonia-preeclampsia máig nem megoldott kérdés, súlyos szövődmények előidézője. A témakör elsősorban hazai szakértőjét, Rigó professzort ezért kértük fel a legfrissebb terápiás elvek összefoglalására.

Az ultrahang leletezés kérdései a nemzetközi protokollok tükrében

Dr. Valent Sándor

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A kiváló színvonalon végzett hazai ultrahang vizsgálatok ellenére számos pert veszítettek el a szülészeti intézetek az elmúlt években. A dokumentáció javításával talán enyhíthető ez az ellentmondás?

Betegbiztonság / Hogyan végezzük jól a munkát, és miként tudjuk elkerülni a jogi következményeket?

Prof. Dr. Rákóczi István

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

Az előző előadáshoz hasonlóan a kérdés elkötelezett szaktekintélyétől, Rákóczi professzortól betegellátásunk jogi biztonságának javítása érdekében várunk javaslatokat.

Műhiba, vagy Big business a nőgyógyászt perelni?

Dr. Martini Jenő

Ügyvédi Iroda, Budapest

Martini ügyvéd úr (aki szülész-nőgyógyász szakorvos is egyébként) talán a legtöbb peres ügyben állt védőként kollégáink oldalán. E perek során szerzett tapasztalatainak összefoglalására kértük.

A D-vitamin hiány megelőzésének jelentősége a várandós anyáknál

Prof. Dr. Szabó András

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Az elmúlt években derült fény arra, hogy a korábban elegendőnek gondolt D-vitamin bevitel többszörösére van szükség a várandósság során (is). Szabó professzor hosszu ideje foglalkozik az újszülöttkori D-vitamin hiány megelőzésével. Mit tehet a szülész-nőgyógyász ez ügyben?

Terhesség során alkalmazott gyógyszeres kezelés hatásai a magzat fejlődési rendellenességeire

Dr. Bánhidly Ferenc

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A terhesség során szükségessé váló gyógyszeres kezeléstől gyakran félünk, és indokolatlan félelmet keltünk a várandósnál is. Melyek a valóban magzatkárosító, és melyek a biztonságos gyógyszercsoportok?

11:15-11:30 Kávészünet

11:30-13:00 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

A várandósság során alkalmazott vitamin- és ásványianyag pótlás gyakorlati kérdései

Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Szükség van-e a „terhesvitaminok”-ra? Valóban túl nagy magzatok születnek, ha vitamint adunk? Mely összetevőik fontosak elsősorban?

A családközpontú szülészet 2013-ban

Dr. Hagymásy László

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Székesfehérvár

Régóta beszélünk családközpontú szülészetről, baba-barát kórházakról, például az otthonszülés biztonságos alternatíváiként is. Hol tartunk 2013-ban?

A habitualis vetélés kivizsgálásának és kezelésének kérdései

Prof. Dr. Pajor Attila

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A habitualis vetélés kérdéseinek vizsgálata különösen fontos a kedvezőtlen hazai szülészeti mutatók mellett. A HABAB Bizottság vezetőjét, Pajor professzort ezért is kértük fel a kérdéskör összefoglalására.

A szívfejlődési rendellenességek ultrahang szűrése

Dr. Belics Zorán

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Az 1. és 2. trimeszteri ultrahang szűrés fejlesztése mellett talán a szív fejlődési rendellenességeinek felismerésére kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk. Belics főorvos úrtól gyakorlati tanácsokat várunk.

A vérzéscsillapítás lehetőségei nőgyógyászati műtétek során

Dr. Lintner Balázs

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A nőgyógyászati műtétek során a mortalitás elsődleges oka a súlyos vérzés kialakulása. Az egyik legjobb fiatal nőgyógyász operatórt ezért kértük fel a vészhelyzet elhárítási lehetőségeinek összefoglalására.

Az endometriosis gyógyszeres kezelése az új ESHRE guideline alapján

Dr. László Ádám

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Az új ESHRE guideline alapján úgy tűnik, hogy a hazai gyógyszeres terápia gyakorlata nem feltétlenül felel meg az európai protokolloknak. Kell-e változtatnunk? Az endometriosis kezelésének kiváló szakértőjét nyertük meg előadóként.

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-15:30 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila

Miért lenne jó a Semmelweis Terv?

Dr. Demeter János

Honvédkórház, Budapest

Demeter főorvos úr, mint első számú szakmapolitikusunk, és mint a Semmelweis Terv elkötelezett híve, a szüléset-nőgyógyászati ellátás optimális szervezésének kérdéseit foglalja össze.

A fenyegető koraszülés kezelése – tocolysis, antibioticum?

Dr. Pap Károly

Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

A fenyegető koraszülés kezelésében számos olyan terápiát alkalmaznak a magyar osztályok, amelyet bizonyítékok nem támasztanak alá. Mik a valóban hatékony lehetőségek, és mit kell elfelejtenünk? Pap főorvos úr az egyik legnagyobb forgalmú hazai osztályt vezeti, és az evidenciákon alapuló orvoslás ismert híve.

Magyarországon nem szokványos szülészeti megoldások gyakorlati kérdései

Dr. Siklós Pál

Szent István Kórház, Budapest

Siklós főorvos úrról közismert, hogy számos olyan szülészeti megoldásban járatos, és alkalmazza azokat osztályán, amelyeket máshol kevesen gyakorolnak. Érdemes ellesnünk a jó ötleteket!

Peri- és postmortem császármetszés. Újraélesztés a terhességben

Dr. Sobel Gábor

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Sobel adjunktus úr a szüléset-nőgyógyászat mellett az oxyológiában is nagy gyakorlattal bír. A határterület rendkívül éles és nehéz kérdéseit foglalja össze számunkra.

Császármetszés – szemészeti indikáció?

Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest

Annak ellenére történik kifejezetten sok császármetszés szemészeti indikáció alapján, hogy vezető szemészek véleménye alapján ilyen indikáció nincs, ez csak dogma. Hol az igazság ebben a kérdésben Professzor úr?

A medencefenék süllyedésének laparoscopos sebészete

Dr. Szabó István

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A medencefenék süllyedésének sebészete óriási változáson ment át a világban. Az egyik lehetséges megoldás a verzátus szakember által végzett laparoscopos műtét. Mely műtéttípusokat érdemes alkalmaznunk?

15:30-15:45 Kávészünet

15:45-17:15 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidny Ferenc

Laparoszkópos szupravaginális amputáció - Egy régi módszer új köntösben

Dr. Németh Gábor

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A supravaginális amputatioinak mindig is voltak hívei a hysterectomiával szemben. A laparoscopos megoldás lehetősége tovább javíthatja a betegek elégedettségét. Németh tanár úr nagy gyakorlattal bír e műtétek területén.

Az operatív hysteroscopia szerepe a klinikai gyakorlatban

Dr. Lintner Ferenc

Szent János Kórház, Budapest

Az operatív hysteroscopia számos intrauterin kórkép legkevésbé invazív megoldását jelentheti. Mik az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján leszűrhető gyakorlati javaslatok? E beavatkozások hazai úttörőjét, a MNET elnökét kértük fel előadónak.

A medencefenék süllyedésének hüvelyi sebészete

Dr. Koppán Miklós

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A medencefenék süllyedésének korszerű nemzetközi sebészete meghaladta a régi hazai operatív gyakorlatot. A korszerű elvek bemutatásához kiváló operatórt, egyben kiváló anatómust nyertünk meg.

A meddőség kezelésének kérdései 35 évnél idősebb életkorban

Dr. Gimes Gábor

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A társadalmi változások hatásaként a gyermekvállalás életkora jelentősen későbbre tolódott, így megnőtt az infertilitas miatt hozzánk forduló 35 évnél idősebb nők aránya. E csoport speciális jellemzőit foglalja össze Gimes tanár úr.

Nőgyógyászati műtétek típusos urológiai szövődményei – diagnosztika és terápia

Dr. Majoros Attila

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

A nőgyógyászati műtétek során kialakuló szövődmények egy jelentős része urológiai jellegű. Hogyan ismerjük fel ezeket, és mik a megoldás lehetőségei? Urologus (és szülész-nőgyógyász) barátunkat kértük fel a tapasztalatok összefoglalására.

Az STD-k szerepe a koraszülés pathogenesisében

Dr. Melczer Zsolt

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A koraszülési arány Magyarországon továbbra is rendkívül kedvezőtlen. A számos kórok közül talán az infekciók oldaláról tudunk a legtöbbet tenni a helyzet javítása érdekében.

20:00 Vacsora

INOFOLIC®

Fogamzást támogató étrend-kiegészítő

Folsav 200 µg

Mio-inozit 2000 mg

Fogamzást támogató étrend-kiegészítő, hozzájárulhat:

- a szabályos ovulációhoz¹
- a menstruációs ciklus rendezéséhez²
- a petesejt minőségének javításához³
- a teherbeesés esélyének növeléséhez

Javasolható:

Mindenkinek, akinél a fiziológiásnál alacsonyabb a mio-inozit és a folsav szint, vagy akinél fokozott bevitelre van szükség.



www.inofolic.hu

egy Lépés az új Élethez...
...a Világ újra kezdődik

tekintettel a hölgyekre
LADEEPHARMA

LadeePharma Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. E. épület
tel.: +36 1 275 0338; +36 1 275 0343
fax.: +36 1 275 3219
email: info@ladeepharma.hu
web: www.ladeepharma.hu

1. E Papaleo, et al.: Myo-inozitol in patients with polycystic ovary syndrome: A novel method for ovulation induction; Gynecological Endocrinology 2007 23:12 (700-703)
2. S. Gerli, et al.: Randomized, double blind placebo-controlled trial: effects of Myo-inositol on ovarian function and metabolic factors in women with PCOS. European Review For Medical and Pharmacological Sciences 2007; 11: 347-354
3. L. Ciotta, et al.: Effects of Myo-Inositol supplementation on oocyte's quality in PCOS patients: a double blind trial. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2011 May; 15(5): 509-514

NOVEMBER 23., SZOMBAT

9:00-10:45 Előadások

Üléselnök: Dr. Ács Nándor

Európai ajánlások a koraszülöttek mortalitásának és morbiditásának csökkentésére és a hazai gyakorlat. Koraszülés – magzati sérülések az ellátási szint függvényében

Dr. Szabó Miklós

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

Ismerve a rendkívül kedvezőtlen magyarországi koraszülési adatokat, különösen fontos, hogy ezeket a gyermekeket legalább a lehető legkevesebb trauma érje a szülés során. Nem biztos, hogy szülészeti ellátásunk hibátlan!

A szív fejlődési rendellenességeinek sebészi megoldásai

Dr. Székely László

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest

A szív fejlődési rendellenességeit elfogadható arányban felismerjük. De milyenek ezeknek a gyermekeknek az életkilátásai? Mely elváltozás operálható és hogyan? Az egyik legelismertebb magyar szívsebész kollégánkat kértük fel a kérdés bemutatására.

Az akut szülészeti vérzések ellátása

Prof. Dr. Papp Zoltán

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest

A szülés rettegett szövődménye a súlyos, csillapíthatatlan vérzés kialakulása. Papp professzor úr kiemelkedő gyakorlattal bír az ehhez hasonló esetek ellátásában. Tapasztalatainak átadására kértük fel.

Bél-sebészeti beavatkozások nőgyógyászati műtétek során

Dr. Pálfalvi László

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Kiterjesztett (elsősorban onkológiai, illetve endometriosis miatt végzett) műtéteink során gyakran találkozunk súlyos bél-érintettséggel. Mik a megoldás lehetőségei? E téren közülünk Pálfalvi főorvos úr rendelkezik a legnagyobb gyakorlattal.

Férfi szexuális funkciózavarok a meddőség hátterében

Dr. Fekete Ferenc

Mr. Clinic rendelő, Budapest

A meddőség hátterében általunk talán kevésbé jól ismert férfi szexuális funkciózavarok is állhatnak. Kiváló andrológus barátunkat, a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnökét kértük fel ezek bemutatására.

A koraszülések típusai, a megelőzés lehetőségei

Prof. Dr. Paulin Ferenc

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A koraszülés a perinatalis morbiditas és mortalitas elsődleges oki tényezője. Magyarországon különösen súlyos a helyzet e téren. Paulin professzor több évtizede kutatja a megelőzés lehetőségeit.

A GBS-szűrés helyzete Magyarországon

Dr. Sziller István

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

A GBS fertőzés szűrésének gyakorlata jelentős szórást mutat a különböző magyar szülészeti osztályok között. A témakör mindannyiunk által elismert elsőszámú hazai szakértőjét kértük fel, hogy az útkeresésben segítséget nyújtson.

10:45-11:00 Kávészünet

11:00-12:45 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidó Ferenc

Az idő előtti burokrepedés kezelése

Dr. Sziller Péter

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Az idő előtti burokrepedés kezelése tekintetében a nemzetközi protokollok sem egységesek. Meddig várhatunk? Milyen gyógyszereket alkalmazunk?

Hosszú távú fogamzásgátlás újratöltve

Dr. Major Tamás

DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A fogamzásgátló módszerek fejlesztése hosszú, és máig is tartó, folyamatos történet. Az elmúlt időben ismét előtérbe került a hosszú távú megoldások keresése.

Koraszülés – magzati shock. A késői köldökellátás jelentősége

Dr. Nobilis András

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A rendkívül sérülékeny koraszülöttek ellátása során számos kis lépés különös jelentőséggel bírhat. Neonatologusaink javaslatára ezért vezettük be klinikánkon a késői köldökellátást is.

A császármetszés növekvő arányának okai

Dr. Gyarmati Béla

Uzsoki utcai Kórház, Budapest

Örökösd, és rendkívül sokat vitatott kérdés a császármetszések arányának növekedése. Mennyi a valóban sok? És miért nő folyamatosan? Megállítható a folyamat?

Intamascularis progeszteron - a fenyegető vetélés kezelési lehetőségei

Dr. Sipos Miklós

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Úgy tűnik, hogy a fenyegető vetélés kezelése során korábban széles körben alkalmazott megoldások egy része (pl. magnesium adása) teljesen hatástalan. Mik a valóban eredménnyel kecsegtető terápiás lehetőségek?

Tanulságok az elmúlt évek szülészeti statisztikai adatai alapján

Dr. Csákány M. György

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Csákány főorvos úr a Tauffer-statisztika legjobb hazai ismerője. Az elmúlt évek statisztikai adataiból milyen tanulságokat érdemes levonnunk?

A metformin alkalmazásának kérdései a meddőség kezelésében és a várandósság során

Dr. Várbíró Szabolcs

Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Milyen a metformin kezelés valódi hatékonysága a meddőség terápiájában? A várandósság során folytatható (vagy folytatandó)-e a terápia, és meddig? Eltérőek az európai és amerikai ajánlások. Hogyan döntsünk?

12:45 A tanfolyam zárása. Tesztvizsga

13:00-14:00 Ebéd

VAGILACT-Q

HÜVELYTABLETTA

Az intim egyensúly!



A Q Pharma büszke arra, hogy az FTC női közilabdacsapatának ARANY FOKOZATÚ támogatója!



Forgalmazó:
Q Pharma Kft., 1053 Budapest, Veres Pálné u.4-6.
www.qpharma.hu

A VAGILACT-Q kezelés eredményeként a betegek több mint 80%-nál teljesen megszűnt a viszketés és bőrirritáció.*

- ✓ A Vagilact-Q hüvelytabletta megakadályozza a gyakori hüvelyi fertőzéseket
- ✓ Csökkenti a hüvelyi pH-t
- ✓ Újjáépíti az optimális mikrobiológiai flórát

*Két hetes időtartamú nyílt elrendelésű klinikai vizsgálat eredményei alapján
Dr. Manuella Mucci - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Ortona (Chieti – Olaszország)

Általános információ

A TANFOLYAM HELYSZÍNE

Thermal Hotel Visegrád
2025 Visegrád, Lepence-völgy

A TANFOLYAM HONLAPJA

www.congressline.hu/update2013

SZERVEZŐ IRODA

CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146, Fax: (1) 429 0147

Papp-Vid Melinda

(kiállítás, szponzoráció)
pappvid@congressline.hu

Gaitz Éva

(regisztráció, szállásfoglalás)
gaitz@congressline.hu

Regisztráció

	2013. október 15. előtt	2013. október 15. után	Helyszínen
Résztevő	27.000 Ft	31.000 Ft	35.000 Ft
Rezidens, szakorvos jelölt (igazolással)	21.000 Ft	25.000 Ft	28.000 Ft
Kísérő	23.000 Ft	25.000 Ft	27.000 Ft
Napjegy (péntek)			20.000 Ft
Napjegy (szombat)			17.000 Ft

A részvételi díj 27% Áfa-t és 9.800 Ft értékben közvetített étkezést tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza a rendezvényen való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás megtekintését és az ebédeket.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a részvételt a társasági programokon (a tanfolyam tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók).

A napjegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, kitzűzöt és a programfüzetet.

A REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA A TANFOLYAM IDEJE ALATT

2012. november 22., péntek 08:00 – 18.00

2012. november 23., szombat 08.00 – 12.00

KREDIT PONT

A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 50 kreditpontot szerezhetnek. (SE-TK/2013.II/00332)

TÁRSASÁGI PROGRAM

2013. november 22., péntek 20:00 óra

Vacsora a Thermal Hotel Visegrádban
(fakultatív, 4.900,-Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a társasági programon csak kitűzővel és meghívóval lehet részt venni!

EBÉD

A tanfolyam ebédszünetében a Thermal Hotel Visegrád éttermében szűkített svédasztalos ebédet biztosítunk november 22-én és 23-án.


LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a Szervezőirodánál.

2013. november 1. előtt a részvételi díj 80%-át a szálláselőleg és a fakultatív program egészét visszafizetjük. A megadott határidők után nem áll módunkban a részvételi díjat a szálláselőleget és a fakultatív program díját visszatéríteni.

PARKOLÁS


Ingyenes a Hotel parkolójában.



Kiállítói alaprajz

Sejtbank Kft.	1
Elektro-Optika Kft.	2
Sandoz Hungária Kft.	3
Johnson&Johnson/Ethicon	4
Teva Magyarország Zrt.	5
Richter Gedeon NyRt.	6
Vitaminkosár Kft.	7
Bayer Hungária Kft.	8
Merck Kft.	9
Hipp Kft.	10
Q Pharma Kft.	11
Boehringer Ingelheim	12
Ferticad Kft.	13
Gyümölcsborokháza.hu Kft.	14
Wörwag Pharma Kft.	15
Krio Intézet Zrt.	16
LadeePharma Kft.	17

Jegyzet



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21 Nőgyógyászati Marketing Osztály: 431 4391 Fax: 431 4449 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

Gyógyszerkészítmény megnevezése: Belara 0,03 mg/2 mg filmtabletta. **Minőségi és mennyiségi összetétel:** 0,030 mg etinilösztadiol és 2 mg klórmadinon-acetát (1,71 mg klórmadinonnak felel meg) filmtablettaként. **Javallat:** Hormonális fogamzásgátlás. **Adagolás és alkalmazás:** Minden nap ugyanabban az időben egy filmtablettát kell bevenni 21 egymást követő napon át, majd hét napos szünetet kell tartani. A hét napos gyógyszermentes időszak után a gyógyszer szedését tovább kell folytatni a következő csomag Belara-val, függetlenül attól, hogy a vérzés megszűnt-e vagy sem. **Ellenjavallatok:** Artériás vagy vénás trombózis, tromboflebitisz, nem kontrollált diabetes mellitus, nem kontrollált hipertónia, APC-rezisztencia, antithrombin-III hiány, protein-C hiány, protein-S hiány, hiperhomociszteinémia, és antifoszfolipid ellenanyagok, májfunkciózavarok, generalizált viszketés, epepangás, különösen megelőző terhesség vagy ösztrogén-terápia során, Dubin-Johnson szindróma, Rotor-szindróma, korábbi vagy jelenleg fennálló májdaganat, májmegnagyobbodás, a lipidanyagcsere súlyos zavarai, migrénes fejfájás tünetei, korábbi migrén fokális neurológiai tünetekkel, súlyos depresszió, megmagyarázhatatlan genitális vérzés, a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:** A Belara ösztrogén alkotóelemének, az etinilösztadiolnak a kölcsönhatásai más gyógyszerekkel emelhetik vagy csökkenthetik az etinilösztadiol szérumkoncentrációját. Ha ezekkel a hatóanyagokkal tartós terápia szükséges, akkor nem hormonális fogamzásgátlási eljárásokat kell alkalmazni. **Terhesség és szoptatás:** Terhesség alatt a Belara szedése nem javallt. Az ösztrogének befolyásolhatják a szoptatást, mivel módosíthatják az anyatej mennyiségét és összetételét. Ezért a Belara szoptatás során nem alkalmazható. **Leggyakoribb mellékhatások:** áttörésszerű vérzés, pecsételő vérzés, fejfájás és emlőfájdalom. A szabálytalan vérzés a Belara szedésének folytatása mellett rendszerint csökken. **Rendelhetőség:** csak vényre kiadható gyógyszer. **TB támogatás:** nem támogatott. **Forgalomba hozatali engedély száma:** OGYI-T-8786/01.-02. **Alkalmazási előírás engedélyszáma:** 39369/2011. **További információt a részletes alkalmazási előírás tartalmaz!** Lezárás dátuma: 2013.10.09.



I ♥ LARC

LARC: Long-acting reversible contraception =
Hosszútávú visszafordítható fogamzásgátlás

Jaydess® 13,5 mg méhen belüli gyógyszerleadó rendszer (OGYI-T-22404/01) ATC: G02BA03

H: 13,5 mikronizált levonorgesztrel.

J: Fogamzásgátlás, legfeljebb 3 évig.

A: Az eszköz a méh üregébe helyezve 3 éven keresztül fejti ki hatását.

E: Terhesség, kismedencei gyull., akut cervicitis vagy vaginitis; postpartum endometritis vagy fertőzések vetélés három hónapon belül; cervicalis intraepithelialis neoplasia, uterus vagy a cervix rosszindulatú tumora, progesztogén érzékeny tumorok, tisztázatlan etiológiájú, rendellenes hüvelyi vérzés, az uterus ürét torzító congenitalis eredetű vagy szerzett alakú rendellenességei, akut májbetegség vagy májdaganat, gy.érz.

M: fejfájás, hasi fájdalom, akne, hátfájás, menstruációs vérzés menny. változás, petefészekciszta, vulvovaginitis, depresszió, migrén, émelygés, alopecia, genitális traktus felső részének fertőzése, dysmenorrhoea, mellfájdalom, kilökődés, folyás.

Kiadhatóság: Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz).

Kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előíratát!

A rövidített leírás forrásul szolgáló, hivatalos alkalmazási leírás dátuma: 2013. május 24.



Bayer HealthCare

Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 06-(1)-487-4100; Fax: 06-(1)-212-1574
www.bayerhungaria.hu
www.baymedinfo.hu

 jaydess®

13.5 MG INTRAUTERINE DELIVERY SYSTEM
LEVONORGESTREL